

## Série d'exercices


Corrigés

Classe : 1re SPE

Lycée : Evariste Galois

## Exercice n°1

Dans chacun des cas suivants, déterminer le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ , puis en déduire une valeur approchée de la mesure (en degrés) de l'angle  $(\vec{u}, \vec{v})$ .



- I le milieu de  $[AB]$ ;
- J le milieu de  $[AD]$ ;
- K le milieu de  $[ID]$ .

1. Montrer que  $\overrightarrow{DK} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{4}AB^2$ .

2. Montrer que  $(AK)$  et  $(BJ)$  sont perpendiculaires.

## Exercice n°4


1. Deux forces  $\vec{F}_1$  et  $\vec{F}_2$  sont appliquées en un point  $O$ , formant un angle de  $50^\circ$ .

Leur intensité est respectivement de 300 N et 200 N.

Par définition, la résultante est le vecteur  $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ .

Calculer l'intensité de cette résultante.

2. Pour tirer sur 50 mètres une péniche, un cheval exerce une force  $\vec{F}$  de 2000 N au point où est accrochée la corde sur la péniche. La corde fait un angle de  $45^\circ$  avec la direction de la péniche.




On rappelle que le travail d'une force  $\vec{F}$  est  $W = \vec{F} \cdot \vec{u}$ , où  $\vec{u}$  est un vecteur représentant le déplacement de l'objet.

- (a) Calculer  $W$ .
- (b) Calculer l'intensité de la force que doit exercer un bateau tirant cette même péniche et se déplaçant dans la même direction que celle-ci pour que le travail soit le même.

## Exercice n°2

$ABCD$  est un rectangle tel que  $AB = 4$  et  $AD = 2$ .  $E$  est le point de  $[DC]$  tel que  $DE = 1$ . Les droites  $(AE)$  et  $(BD)$  se coupent en  $H$  et  $N$  est le milieu de  $[AB]$ .




- Décomposer  $\overrightarrow{AE}$  et  $\overrightarrow{BD}$  à l'aide de la relation de Chasles, puis calculer  $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BD}$ .  
Que peut-on conclure quant à  $(AE)$  et  $(BD)$ ?
- En calculant de deux façons différentes  $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BD}$ , trouver  $BH$ .
- Montrer que  $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} = 2\overrightarrow{HN}$ .
- Calculer  $HA$ , puis montrer que  $\overrightarrow{HN} \cdot \overrightarrow{HA} = \frac{8}{5}$ .
- Justifier que  $HN = 2$ .
- Calculer  $\cos(\widehat{AHN})$  et en déduire une valeur approchée de  $\widehat{AHN}$  au degré près.

## Exercice n°3

Soit  $ABCD$  un carré. On pose :

## Exercice n°5



1. Montrer que

$$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = OA^2 + AB \times AC.$$

2. Calculer  $\widehat{BOC}$ .

### Exercice n°6

Soit ABCD un carré de centre O tel que  $AB = 2$ . On pose I le milieu de [AB].

1. Démontrer que l'ensemble des points M tels que

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = 2$$

est la droite (OI).

2. (a) Montrer que, quel que soit le point M du plan,

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - 1.$$

(b) Quel est l'ensemble des points M tels que  $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 4$ ?

### Exercice n°7

On considère deux points A et B tels que  $AB = 6$ , ainsi que I le milieu de [AB].

On pose  $\mathcal{E}_k$  l'ensemble des points M tel que

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k,$$

où  $k \in \mathbb{R}$ .

1. Montrer que pour tout point M du plan,

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - 9.$$

2. En déduire  $\mathcal{E}_{16}$ .

3. Pour quelles valeurs de  $k$  l'ensemble  $\mathcal{E}_k$  est-il réduit à l'ensemble vide?

### Exercice n°8

1. Soit ABCD un parallélogramme tel que  $AB = 5$ ,  $AD = 3$  et  $AC = 6$ .

(a) Calculer  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ .

(b) En déduire la valeur approchée à l'unité de la mesure de l'angle  $\widehat{DAB}$ .

2. Soit EFGH un parallélogramme tel que  $EF = 6$ ,  $EH = FH = 5$ .

(a) Calculer  $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EH}$ .

(b) En déduire la valeur approchée à l'unité de la mesure de l'angle  $\widehat{FEH}$ .

3. Soit IJKL un parallélogramme tel que  $IK = 8,5$  et  $JL = 5$ .

(a) Calculer  $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{IL}$ .

(b) Montrer que  $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{IK} = IJ^2 + \frac{189}{16}$ .

(c) En déduire que  $IJ^2 - 8,5 \cos(\overrightarrow{IJ}, \overrightarrow{IK}) IJ + \frac{189}{4} = 0$ .

(d) En déduire que  $\cos^2(\overrightarrow{IJ}, \overrightarrow{IK}) \geq \frac{189}{289}$ .

(e) En déduire un encadrement approximatif (à l'unité près) de l'angle  $(\overrightarrow{IJ}; \overrightarrow{IK})$  en degrés.

### Exercice n°9

Dans le plan, on considère un point M et un cercle  $\Gamma$ , de centre O et de rayon r.

Soit d une droite passant par M et coupant  $\Gamma$  en deux points A et B.

On appelle *puissance de M par rapport à  $\Gamma$*  le nombre :  $\mathcal{P}_\Gamma(M) = OM^2 - r^2$ .

1. En considérant le projeté orthogonal de O sur (AB), c'est-à-dire le point H de (AB) tel que  $(OH) \perp (AB)$ , montrer que :

— si M est à l'extérieur de  $\Gamma$  alors  $MA \times MB = \mathcal{P}_\Gamma(M)$ ;

— sinon,  $MA \times MB = -\mathcal{P}_\Gamma(M)$

2. On considère un cercle  $\Gamma'$ , de centre  $O'$  distinct de O, et de rayon  $r'$ . Soit M un point tel que  $\mathcal{P}_\Gamma(M) = \mathcal{P}_{\Gamma'}(M)$ .

(a) Soient K le projeté orthogonal de M sur  $(OO')$  et I le milieu de  $[OO']$ .

Après avoir justifié que  $r^2 - r'^2 = MO^2 - MO'^2$ , montrer que  $r^2 - r'^2 = 2\overrightarrow{OO'} \cdot \overrightarrow{IK}$ .

(b) Déterminer alors l'ensemble des points M.


Cet ensemble est appelé *l'axe radical des deux cercles*.

3. Soit  $\Gamma''$  un troisième cercle de centre  $O''$  tel que  $O''$  n'appartient pas à  $(OO')$ .

Montrer que les trois axes radicaux sont concourants en vous aidant de la notion de puissance d'un point par rapport à un cercle.

### Exercice n°10

On considère la figure suivante :



ABCD est un parallélogramme tel que  $AB = 4$ ,  $BC = 3$  et  $AC = 6$ .

Calculer  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ .

### Exercice n°11

On considère un carré ABCD de côté 1.

On construit alors les points E et F tels que :

— BEC est un triangle équilatéral ;

— F est un point de la droite (BC).

Déterminer la position du point F pour que les droites (AF) et (DE) soient perpendiculaires.

*Indication* : on pourra se placer dans le repère  $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$ .