

Devoir Maison n°3

Exercice 1 : (8 points)

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]-1 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = x - \frac{\ln(1+x)}{1+x}.$$

La courbe \mathcal{C} représentative de f est donnée sur le document annexe 2 que l'on complétera et que l'on rendra avec la copie.

Partie A : Étude de certaines propriétés de la courbe \mathcal{C}


1. On note f' la fonction dérivée de f . Calculer $f'(x)$ pour tout x de l'intervalle $]-1 ; +\infty[$.
2. Pour tout x de l'intervalle $]-1 ; +\infty[$, on pose $N(x) = (1+x)^2 - 1 + \ln(1+x)$. Vérifier que l'on définit ainsi une fonction strictement croissante sur $]-1 ; +\infty[$. Calculer $N(0)$. En déduire les variations de f .
3. Soit \mathcal{D} la droite d'équation $y = x$. Calculer les coordonnées du point d'intersection de la courbe \mathcal{C} et de la droite \mathcal{D} .

Partie B : Étude d'une suite récurrente définie à partir de la fonction f

1. Démontrer que si $x \in [0 ; 4]$, alors $f(x) \in [0 ; 4]$.
2. On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 4 & \text{et} \\ u_{n+1} = f(u_n) & \text{pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}. \end{cases}$$

- (a) Sur le graphique ci-dessous, en utilisant la courbe \mathcal{C} et la droite \mathcal{D} , placer les points de \mathcal{C} d'abscisses u_0, u_1, u_2 et u_3 .



- (b) Démontrer que pour tout n de \mathbb{N} on a : $u_n \in [0 ; 4]$.
(c) Étudier la monotonie de la suite (u_n) .
(d) Démontrer que la suite (u_n) est convergente. On désigne par ℓ sa limite.
(e) Utiliser la partie A pour donner la valeur de ℓ .

Exercice 2 : (8 points)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$, on considère :

- le plan \mathcal{P}_1 dont une équation cartésienne est $2x + y - z + 2 = 0$,
- le plan \mathcal{P}_2 passant par le point $B(1 ; 1 ; 2)$ et dont un vecteur normal est $\vec{n}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

1. (a) Donner les coordonnées d'un vecteur \vec{n}_1 normal au plan \mathcal{P}_1 .
 (b) On rappelle que deux plans sont perpendiculaires si un vecteur normal à l'un des plans est orthogonal à un vecteur normal à l'autre plan.
 Montrer que les plans \mathcal{P}_1 et \mathcal{P}_2 sont perpendiculaires.
2. (a) Déterminer une équation cartésienne du plan \mathcal{P}_2 .

- (b) On note Δ la droite dont une représentation paramétrique est : $\begin{cases} x = 0 \\ y = -2 + t, t \in \mathbb{R} \\ z = t \end{cases}$

Montrer que la droite Δ est l'intersection des plans \mathcal{P}_1 et \mathcal{P}_2 .

On considère le point $A(1 ; 1 ; 1)$ et on admet que le point A n'appartient ni à \mathcal{P}_1 ni à \mathcal{P}_2 .

On note H le projeté orthogonal du point A sur la droite Δ .


3. On rappelle que, d'après la question 2. b, la droite Δ est l'ensemble des points M_t de coordonnées $(0 ; -2 + t ; t)$, où t désigne un nombre réel quelconque.
 - (a) Montrer que, pour tout réel t , $AM_t = \sqrt{2t^2 - 8t + 11}$.
 - (b) En déduire que $AH = \sqrt{3}$.
4. On note \mathcal{D}_1 la droite orthogonale au plan \mathcal{P}_1 passant par le point A et H_1 le projeté orthogonal du point A sur le plan \mathcal{P}_1 .
 - (a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite \mathcal{D}_1 .
 - (b) En déduire que le point H_1 a pour coordonnées $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$.

5. Soit H_2 le projeté orthogonal de A sur le plan \mathcal{P}_2 .

On admet que H_2 a pour coordonnées $\left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$ et que H a pour coordonnées $(0 ; 0 ; 2)$.

Sur le schéma ci-contre, les plans \mathcal{P}_1 et \mathcal{P}_2 sont représentés, ainsi que les points A , H_1 , H_2 , H .

Montrer que AH_1HH_2 est un rectangle.



Exercice 3 : (4 points)

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = \frac{-x^3+2x^2-x+3}{x^2+1}$.

1. Déterminer trois réels a , b et c tels que : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x^2 + 1}$.
2. Calculer la limite de $f(x) - (ax + b)$ en $+\infty$ et en $-\infty$.
3. En déduire que \mathcal{C} , la courbe représentative de f , admet une asymptote oblique Δ en $-\infty$ et en $+\infty$.
4. Étudier les positions relatives de \mathcal{C} et de Δ .